

Tabla 1S. Especies de hormigas que revisten mayor importancia en los paisajes estudiados en las regiones naturales de Colombia: Caribe (ca), Andina (an), Pacífica (pa), Orinoquia (or), Amazónica (am), Insular (in)

Especies raras	Especies comunes	Especies endémicas	Especies introducidas
Subfamilia Myrmicinae <i>Acanthognathus teleductus</i> (an) <i>Cephalotes femoralis</i> (an) <i>Crematogaster ampla</i> (an) <i>Megalomyrmex wallacei</i> (an) <i>Octostruma impresa</i> (an) <i>Oxyepocus inquilinus</i> (ca) <i>Procryptocerus scabriusculus</i> (an) <i>Solenopsis wasmanni</i> (an) <i>Temnothorax subditivus</i> (an)	<i>Atta cephalotes</i> (am, an, ca, in, pa) <i>Crematogaster abstinens</i> (am, an, ca) <i>Crematogaster carinata</i> (an) <i>Crematogaster curvispinosa</i> (am, an, ca, in) <i>Cyphomyrmex rimosus</i> (am, an, ca) <i>Solenopsis geminate</i> (am, an, ca, in) <i>Pheidole biconstricta</i> (an, ca) <i>Pheidole radoszkowskii</i> (an, ca) <i>Pheidole susannae</i> (an) <i>Wasmannia auropunctata</i> (am, an, ca, in, pa)	<i>Pheidole praeusta</i> (ca) <i>Pheidole micon</i> (ca) <i>Pheidole pygmaea</i> (ca) <i>Pogonomyrmex mayri</i> (ca)	<i>Monomorium florícola</i> (an, in) <i>Monomorium pharaonis</i> (an) <i>Pheidole megacephala</i> (an) <i>Tetramorium bicarinatum</i> (an, in)
Subfamilia Formicinae <i>Camponotus claviscapus</i> (in) <i>Gigantiops destructor</i> (am)	<i>Brachymyrmex heeri</i> (an, ca) <i>Camponotus simillimus indianus</i> (am, an, ca, in) <i>Camponotus lindigi</i> (ca) <i>Camponotus novogranadensis</i> (am, an, in) <i>Paratrechina longicornis</i> (an, ca)	<i>Camponotus dalmasi</i> (ca)	<i>Nylanderia fulva</i> (an) <i>Paratrechina longicornis</i> (an, ca)
Subfamilia Dolichoderinae <i>Dolichoderus diversus</i> (an) <i>Dolichoderus lutosus</i> (am, an, pa) <i>Dorymyrmex brunneus</i> (an) <i>Gracilidris pombero</i> (am)	<i>Azteca instabilis</i> (an, pa) <i>Dolichoderus bispinosus</i> (am, an, in, pa)	<i>Dorymyrmex biconis</i> (ca)	<i>Linepithema humile</i> (an) <i>Tapinoma melanocephalum</i> (an)
Subfamilia Pseudomyrmecinae <i>Pseudomyrmex flavidulus</i> (an, in) <i>Pseudomyrmex godmani</i> (ca) <i>Pseudomyrmex ita</i> (an) <i>Pseudomyrmex kuenckeli</i> (an) <i>Pseudomyrmex levivertex</i> (an) <i>Pseudomyrmex lisus</i> (an)	<i>Pseudomyrmex boopis</i> (an, in, pa) <i>Pseudomyrmex simplex</i> (an, ca, in)		
Subfamilia Ecitoninae <i>Neivamyrmex iridescens</i> (an) <i>Nomamyrmex hartigii</i> (an)	<i>Eciton burchellii</i> (am, an, pa) <i>Labidus coecus</i> (am, an, ca, in, pa) <i>Labidus praedator</i> (am, an, pa)		
Subfamilia Ectatomminae	<i>Ectatomma ruidum</i> (an, am, ca, or, pa)	<i>Gnamptogenys brunnea</i> (an,pa) <i>Gnamptogenys dichotoma</i> (an) <i>Gnamptogenys ejuncida</i> (an) <i>Gnamptogenys gentryi</i> (an) <i>Gnamptogenys nigrivitre</i> a (an)	

		<i>Gnamptogenys pilosa</i> (pa)	
Subfamilia Heteroponerinae <i>Acanthoponera minor</i> (an)	<i>Heteroponera microps</i> (an)	<i>Heteroponera inca</i> (an, pa) <i>Heteroponera monticola</i> (an)	
Subfamilia Ponerinae <i>Belonopelta deletrix</i> (pa) <i>Centromyrmex alfaroi</i> (am) <i>Pachycondyla chyzeri</i> (pa) <i>Pachycondyla striatinodis</i> (an, in) <i>Pachycondyla succedanea</i> (ca) <i>Pachycondyla villosa</i> (an, in, pa) <i>Platythyrea prizo</i> (pa)	<i>Odontomachus bauri</i> (am, an, ca, in, or, pa) <i>Odontomachus erythrocephalus</i> (an, pa) <i>Pachycondyla becculata</i> (am, an, pa) <i>Pachycondyla constricta</i> (am, an, ca, in) <i>Pachycondyla impresa</i> (am, an, ca, pa)	<i>Anochetus elegans</i> (an) <i>Belonopelta attenuata</i> (an)	
Subfamilia Proceratiinae		<i>Proceratium catio</i> (an)	
Subfamilia Amblyoponinae <i>Stigmatomma orizabanum</i> (an, in, pa) <i>Stigmatomma mystriops</i> (in)	<i>Prionopelta antillana</i> (an, ca)		
Subfamilia Cerapachyinae <i>Cylindromyrmex whymperi</i> (an)			