ADICIONES A LAS AVES DE LA COMISARIA DEL VAUPES (COLOMBIA), I

ANTONIO OLIVARES, O. F. M.

Profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.

A los registros de especies aviarias de la Comisaría del Vaupés* (*cf.* Olivares, 1955 y Olivares y Hernández 1962) con un total de 135 especies, se agregan en esta publicación 84 especies y subespecies, de las cuales solamente habían sido registradas de esta región 11 en su gran mayoría por una o dos capturas.

El material fue coleccionado por el R. P. Alfonso Gil Y., M.X.Y. en Mitú y San José del Guaviare, de mayo a diciembre de 1961. Además, unos pocos ejemplares, como se indica en el texto, fueron capturados por el autor.

Para información sobre Mitú consúltense los dos trabajos anteriormente citados. El corregimiento de San José del Guaviare está situado hacia el extremo noroeste de la Comisaría del Vaupés, y separado de la región sur del Departamento del Meta por el río Guaviare; el área de su pequeño caserío está ubicada a unos 200 metros del caudal de dicho río y sobre un banco de la margen derecha, a 2° 34′ 50″ de latitud norte y a 72° 38′ 30″ de longitud occidental de Greenwich. Dista de Bogotá 270 kilómetros en línea recta y de Mitú, 330. Altura 210 m.; temperatura media 29°C, extremas, 33°-23°; humedad 80%; lluvia 2.500 cm³.; viento dominante norte vel. p. s. 9 metros. En los alrededores del caserío se ha talado la selva en un área de unos 5 km² lo que se ha convertido en campo de aterrizaje, potreros, pequeños cultivos de arroz, maíz, yuca y plátano. La selva circunvecina es densa y alta, a la margen opuesta del río se divisan zonas de selva y sabanas en parte cultivadas. Fuera de la industria agrícola los habitantes se dedican a la pesca y cultivo de cerdos cuyos productos los transportan por avión principalmente a Villavicencio.

De cada una de las especies aquí anotadas se dan los registros anteriores en la región cisandina colombiana Orinoquia y Amazonia (véase mapa adjunto) que corresponde a una parte del Departamento de Boyacá, al del Meta, a las Intendencias de Arauca y Caquetá y a las Comisarías del Vichada, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas cuyas localidades precisas se anotan en el texto e información acerca de ellas puede verse en De Schauensee, 1948 y 1952. Dichos registros han sido tomados de De Schauensee (1948, 1949, 1950, 1951 y 1952), Dugand (1952), Borrero (1955), Blake (1961 y 1962) y Olivares (1962). A manera de cotejo geográfico se tuvieron en cuenta con los registros de las especies aquí anotadas los publicados de las mismas en el Brasil (Pinto, 1938 y 1944); en Venezuela (Phelps y Phelps, Jr. 1950 y 1958 y Friedmann, 1948).

Para la investigación llevada a cabo por el autor en la avifauna del oriente colombiano fue interesante el presente estudio de San José del Guaviare (Vaupés), localidad vecina a la región sur de la Serranía de La Macarena de cuyas aves ya se tiene algún conocimiento (Olivares, 1962). Esta última región se cita en el texto como "La Macarena sur" para distinguirla de las localidades dadas por Blake (1962) "La Macarena norte".

Se registran por primera vez en la avifauna colombiana a *Seleneidera nattereri* y *Sublegatus modestus brevirostris* (migratorio del hemisferio austral); se confirma la existencia de *Galbula dea brunneiceps*. Se anota por primera vez en la región cisandina colombiana la presencia de *Anas discors* y *Vireo flavifrons*.

COCHLEARIIDAE

Cochlearius cochlearius cochlearius (Linneo)

Mitú: 1.

No se encuentra ninguna diferencia entre este espécimen y una buena serie del Departamento del Atlántico, lo cual prueba que la subespecie *panamensis* Griscon, 1926, si se encuentra en Colombia es tan sólo en la propia vecindad con Panamá de donde hay un registro en la costa oriental del golfo de Urabá, Acandí (*cf.* De Schauensee, 1952: 1145); tampoco se descarta la posibilidad de que este espécimen haya venido a costas colombianas en una corta migración.

De la presencia de *Cochlearius* en la Comisaría del Vaupés, en cuanto fue posible averiguar, sólo se tenía noticia de ella por una publicación de Dugand (1952: 10) donde la incluye entre "Aves reconocidas solamente de vista". De la región cisandina colombiana, se había registrado en Acacías, río Ariari y La Macarena sur. En Tres Esquinas se le ha observado, pero no existen capturas para la ciencia, lo mismo que en el río Casanare cerca a Rondón.

THRESKIORNITHIDAE

Phimosus infuscatus berlepschi Hellmary

Mitú: 1 ♂, T. P.

Difiere de especímenes de diversas localidades colombianas por no tener como éstos plumas alargadas en el occipucio, parte posterior y superior del cuello; además, en estas regiones como en lo restante de la cabeza y cuello no presenta el negro verdoso violáceo iridiscente y la coloración del cuerpo en general es más clara, menos brillante, quizás porque el plumaje está desgastado; el ala es un poco más grande (285 mm.).

La localidad más cercana al Vaupés donde se había coleccionado este ibis es La Macarena sur (*cf.* Olivares, 1962: 314).

Debe ser muy raro en la región de Mitú debido a la ausencia de praderas, pero probablemente se aumentará su número a causa del incremento que están tomando los potreros.

Registrada en Villavicencio, río Ocoa, Quenane, Apiay.

* Por ley 18 de 1963 (junio 13) se creó la Comisaría Especial del Guainía, por segregación territorial de la Comisaría Especial del Vaupés. No obstante, las localidades de las aves tratadas en esta publicación quedan dentro del territorio de la nueva Comisaría Especial del Vaupés; ver mapa adjunto. (Diario Oficial número 31135 del 19 de julio, 1963).

ANATIDAE

Anas discors subsp.

Mitú: 1.

Este ejemplar constituye el primer registro de la especie en la región cisandina colombiana.

Está en el plumaje del otoño y fresco. Capturado en diciembre.

ACCIPITRIDAE

Hypomorphnus urubitinga urubitinga (Gmelin)

Mitú: 1. Caño Cuduyarí: 1.

Registrada en Puerto López, Macarena sur, Leticia y Loretoyacu.

PHASIANIDAE

Colinus cristatus sonnini (Temminck)

San José del Guaviare: 1.

Por coloración es una hembra y concuerda con series de este sexo de los Llanos del Meta, que limitan con la localidad del presente ejemplar. Blake (1962: 76-77) dice: "Nevertheless there is evidence that birds from the east Colombian lowland vary individualy in the manner of *sonini,* as reported by Todd (1920, p. 197-200)", y registra de esta subespecie 5 machos y 6 hembras de Los Micos (La Macarena norte).

A la zona inmediata al Piedemonte Andino, se le ha asignado la *parvicristatus* con registros en varias localidades.

RALLIDAE

Porphyrula martinica (Linneo)

Mitú: 2.

Registrada en Villavicencio, Florencia, Morelia, Belén y Loretoyacu.

HELIORNITHIDAE

Heliornis fulica (Boddaert)

Mitú: 2.

Registrada en Villavicencio y en el río Apaporis (Vaupés).

Es una especie más bien rara en Colombia.

CHARADRIIDAE

Belonopterus cayennensis cayennensis (Gmelin)

San José del Guaviare: 1.

Olivares (1962: 319) da relación de 3 ejemplares coleccionados en La Macarena sur. Hay también registros de la laguna de Falote y de San Martín.

Charadrius collaris Vieillot

San José del Guaviare: 1.

En La Macarena sur Olivares (1962: 320) coleccionó varios ejemplares en ambos sexos y distintas edades. Registrada también en el río Guatiquía, Villavicencio, Morelia y Tres Esquinas.

SCOLOPACIDAE

Capella undulata undula (Boddaert)

Mitú: 1 ♀ .

Ala, 164.5; cola, 58; pico, 107; tarso, 47 mm. Es un ejemplar de ala grande, pues está su longitud cerca al máximo (165) dado por los autores para esta subespecie. Comparado con un ejemplar del río Manacacías, Meta (único registro que existía del oriente y tal vez de todo el país) se nota que el del Vaupés tiende a presentar el barreteado de las regiones inferiores más ancho que el del Meta, aproximándose en este detalle a la subespecie *gigantea* (Temminck) del Brasil.

LARIDAE

Phoetusa simplex simplex (Gmelin)

San José del Guaviare: 1.

Registrada en Villavicencio, Puerto López, Pachaquiaro, Tres Esquinas, Mocagua, Loretoyacu y Leticia.

RYNCHOPIDAE

Rinchops nigra cinerascens Spix

Río Vaupés: 1.

Por dimensiones debe ser un macho: ala, 433; cola, 136; culmen 87; tarso, 36 mm. Es un ejemplar bastante grande, pues sus dimensiones entran mejor por *intercedens* Saunder, pero por coloración es *cinerascens* si se tiene en cuenta, en primer lugar, que las coberteras infra-alares son completamente grises; la cola es muy oscura y apenas lleva un borde longitudinal blanco muy angosto en el vexilo externo de las rectrices exteriores; los bordes de las rémiges secundarias no presentan sino vestigios de blanquecino.

Registrada en Apiay, laguna de Falote, Puerto López, La Macarena sur y un "sight record" de Tres Esquinas.

COLUMBIDAE

Columba speciosa Gmelin

Mitú: 1. San José del Guaviare: 1.

El espécimen de San José del Guaviare es en un todo idéntico a ejemplares de La Macarena sur y de otras localidades incluyendo la región trasandina colombiana. El del Mitú es diferente a todos los ejemplares de las colecciones estudiadas por presentar la mancha blanca subapical de las plumas del cuello bastante reducidas, lo mismo que la banda de castaño que le sirve de base al blanco; el borde apical de dichas plumas es de un violáceo muy brillante; el saraviado del pecho es más claro que el del material de comparación. Eventualmente pudiera tratarse de una subespecie nueva en el extremo oriente colombiano.

Registrada en Villavicencio, La Macarena sur y norte y Maipures; además, existe un "sight record" de Tres Esquinas.

Columba cayennensis cayennensis Bonnaterre

San José del Guaviare: 1.

El autor (Olivares, 1962: 321) encontró esta especie en La Macarena sur en gran abundancia tanto en selva densa como en sitios áridos.

Registrada en 14 localidades de la región cisandina colombiana: de norte a sur, de Villavicencio a Leticia y al oriente hasta San Felipe.

PSITTACIDAE

Ara severa castaneifrons Lafresnaye

San José del Guaviare: 3.

Registrada en los ríos Meta y Ocoa; además de Apiay, Morelia, Tres Esquinas y Mocagua.

Ara manilata (Boddaert)

San José del Guaviare: 1.

Se diferencia de 3 ejemplares del Meta por tener el pecho manchado de antecino ferruginoso en lugar de lilacíneo y el parche abdominal es de rojo claro más encendido.

Registrada en Apiay, Quenane, río Ocoa, Turimena y Umbría.

Aratinga pertinax lehmanni Dugand

San José del Guaviare: 1.

Pudiera tratarse de *venezuelae,* Zimmer y Phelps, 1941, que se ha coleccionado en Maipures (extremo oriental colombiano, parte alta del río Orinoco) de la cual es muy difícil distinguirla.

Se adscribe a *lehmanni* por la cercanía de su localidad típica, Caño Quenane (Llanos del Meta) con San José del Guaviare.

Registrada en Villavicencio, río Ocoa, Caño Suría y Maipures.

Amazona ochrocephala ochrocephala (Gmelin)

San José del Guaviare: 1.

Lleva la frente levemente teñida de azuloso pero no en tal grado que pueda colocarse en *nattereri* (Finsch). El amarillo de la cabeza está muy poco extendido, probablemente es un ejemplar joven.

Registrada en Palmar, Barrigón, Villavicencio, La Macarena norte y sur y Tres Esquinas.

Amazona farinosa inornata (Salvadori)

San José del Guaviare: 1.

Entra por dimensiones en la subespecie *inornata,* ala, 250; cola, 139 mm.

Registrada en Apiay, río Ocoa, río Guatiquía, Barrigón y La Macarena norte (Los Micos).

STRIGIDAE

Otus choliba crucigerus (Spix)

San José del Guaviare: 1.

En La Macarena sur a unos 150 kilómetros al occidente de San José del Guaviare, se le oía cantar pero no se le capturó y así Olivares (1962: 305-323) dijo: "... el 31 de enero (1959) a las 3 a. m. cantó cerca a uno de los campamentos un buho: *currucutúcutú;* probablemente *Otus coliba cincigerus*".

Registrada en Villavicencio, Peralonso, La Macarena norte (Los Micos).

CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus maculicaudus (Laurence)

San José del Guaviare: 1.

Registrada en Macacuní, límites con Venezuela y a 4 kms. del punto donde se encuentran los límites de Colombia, Venezuela y Brasil. Borrero (1960: 497) trae, con motivo de recientes capturas, una buena relación de la especie en Colombia, pues hasta hace unos pocos años se tenía como rara en este país. Recientemente fue coleccionada en La Macarena sur, en cuanto se refiere a la región cisandina colombiana, y en el ICN hay un ejemplar no registrado en la literatura, de los alrededores de San Carlos de Guaroa (Meta).

TROCHILIDAE

Phaetornis ruber nigricinctus Lawrence

Mitú: 1 ♀. Agosto 15, 1960. Coleccionado por A. Olivares.

De Schauensee al examinar este ejemplar dijo (*in lit.*): "The very short wing shows this bird to belong to the above species". Ala, 31; cola, 28; culmen expuesto, 21 mm. Está en plumaje fresco. Iris negruzco, pico: maxila negra, mandíbula amarillenta con la punta negra; patas, rosado carne, uñas negras. Contenido estomacal, néctar.

Bastante escasa en colecciones hechas en Colombia. Registrada en Morelia.

Campylopterus largipennis largipennis (Boddaert)

Mitú: 2.

Registrada en San Felipe; es lo único que existía de la subespecie en Colombia.

Florisuga mellivora (Linneo)

San José del Guaviare: 1. Mitú: 3.

Un ejemplar de Mitú es hembra por coloración, los tres restantes, machos. Comparados con material de la la región de la costa atlántica y otros del centro del país, no se notó ninguna diferencia. De la región cisandina colombiana tan sólo se tenía idea de la especie por dos o tres registros del Meta y por una piel que adornaba una vestimenta indígena en el río Igará-paraná, afluente del río Putumayo.

Leucippus theresiae leucorhous (Sclater y Salvin)

Mitú: 2 ♀ Agosto 11 y 15, 1960 respectivamente. Coleccionados por A. Olivares.

Sobre estos ejemplares De Schauensee, quien los examinó, dijo (*in lit.*): "The only person to mention the white at the base of the tail is Zimmer!". (*Cf.* Zimmer (1950: 2-3)).

Es característico el llevar blanco en la base de las rectrices como también en el borde apical de las mismas sobre todo el de las más exteriores.

Tan sólo se tenía noticia de este colibrí en Colombia por un registro en el río Guainía.

ALCEDINIDAE

Chloroceryle aenea aenea (Pallas)

Mitú: 1.

Registrada en Villavicencio, y hay un "sight record" cerca de Leticia.

GALBULIDAE

Galbula dea brunneiceps (Todd)

Caño Cuyudarí: 2.

Ambos ejemplares deben ser hembras porque según Todd (1943: 7) para especímenes de este sexo anota como dimensiones de cola, 130 a 151 (137.4) y para los machos 140 a 160 (146.7 mm.); pico (desde el rictus) hembras, 56-63 (60.1); machos, 63-70 (66.6). Los ejemplares del Vaupés, cola 133-130; pico desde el rictus, 52-58 mm.

Ala en el material del Vaupés, 88-89 mm.

Ambos están en plumaje fresco, pero uno tiene la punta de la cola, un poco desgastada.

Se tenía noticia de esta especie en Colombia por dos ejemplares sin cabeza que se encontraron adornando la vestimenta de un Indio Miraña en el río Caquetá, al occidente de La Pedrera. Capturaría el nativo Miraña los especímenes en esa región de Colombia o los adquiriría en una u otra manera del Brasil? En todo caso por los dos especímenes aquí anotados del Mitú, se sabe con seguridad que la especie *dea* habita en Colombia y en la subespecie *brunneiceps,* según su área de distribución dada por su autor (*loc. cit. supra*: "North bank of the Amazon, from the río Negro west to Perú...") que comprende la región de Mitú.

BUCCONIDAE

Bucco macrodactylus (Spix)

Mitú: 1.
Registrada en San Felipe (Guainía), Villavicencio, Buenavista, Morelia, Umbría, Maipures y Loretoyacu.

Bucco tamatia tamatia Gmelin

Caño Cuduyarí: 1.
Registrada en Maipures.

Malacoptila fusca fusca (Gmelin)

San José del Guaviare: 3.
Registrada en Macacuní (Guainía). Ultimamente fue obtenida en La Macarena norte en el río Guapaya.

Monassa nigrifrons nigrifrons (Spix)

San José del Guaviare: 1.
Es un ejemplar joven por tener la cabeza de color negro grisáceo y la frente, garganta y pecho teñidos de ocráceo.
Registrada en el caño Cuduyarí (Vaupés).

Chelidoptera tenebrosa tenebrosa (Pallas)

San José del Guaviare: 1.
En La Macarena sur el autor coleccionó 5 hembras (*cf.* Olivares, 1962: 328). Registrada también en Villavicencio, Quenane, Maipures, Morelia y Tres Esquinas.

RAMPHASTIDAE

Pteroglossus pluricinctus Gould

San José del Guaviare: 1. Caño Cuduyarí: 1.
Registrada de Villavicencio, Acacías, río Guayuriba, Chafurray, Florencia, Morelia y Mocoa.

Pteroglossus flavirostris flavirostris Fraser

San José del Guaviare: 1.
Registrada en Villavicencio, río Ocoa, Morelia, Florencia, Tres Esquinas y Leticia.

Seleneidera nattereri (Gould)

Pteroglossus nattereri Gould, Proc. Zool. Soc. London, pt. *3,* 1835 (1836), p. 157 (Brasil).
Mitú: 1.
Primer registro de esta especie en Colombia. De Schauensee (1949: 624) dice que había sido registrada en Yavaraté (Brasil) río Vaupés distante unos pocos centenares de yardas del territorio colombiano, en la desembocadura del río Papurí en el río Vaupés.

PICIDAE

Celeus grammicus grammicus (Malherbe)

Mitú: 1.
Por coloración es un macho; además es joven por no tener en el rojo ocráceo de la cabeza y cresta pintas negras.
Registrada en Macacuní y San Felipe. En el Meta y Caquetá existe la subespecie *verreauxii* (Malherbe), registrada en el río Guapaya y Morelia.

Dryocopus lineatus lineatus (Linneo)

Caño Cuduyarí: 1.
Registrada en Mitú y Yuruparí (Vaupés), Villavicencio, Yurimena y Morelia.

Picumnus pumilus Cabanis y Heine

San José del Guaviare: 1, Mitú: 1.
En Colombia tan sólo se había registrado en Maipures.

DENDROCOLAPTIDAE

Glyphorhynchus spirurus rufigularis Zimmer

Mitú: 1.
De la descripción del tipo (un macho del Monte Duida en Venezuela, Zimmer (1934: 3-4)) el ejemplar de Mitú difiere, así como uno de Villavicencio, por no tener los "Lores whitish with narrow dusky tips", lo único que sí se observa es el que las rayas astilares pálidas en esta región son tan conspicuas como en la frente.
Registrada en el río Vaupés enfrente a Tauapunto, en Los Micos y Pico Rengifo (La Macarena norte).

FURNARIIDAE

Sinallaxis rutilans caquetensis Chapman

Mitú: 2.
Auncuando De Schauensee (1950: 673) da como distribución de esta subespecie el extremo oriente de Colombia, los 2 especímenes del Vaupés concuerdan exactamente con lo dicho por Chapman (1917: 406) principalmente por tener las áreas rufas muy oscuras "mahogany-red rather than cinnamon-rufus"); los flancos y la región abdominal "olive-fuscus with a slight tint of the color of the breast rather than buffy brown".
Registrada en el río Guapaya (La Macarena norte), Florencia y Morelia.

Ancistrops strigilatus strigilatus (Spix)

San José del Guaviare: 1.
2 machos de Tres Esquinas (Caquetá) tienen estas dimensiones: ala, 89-100; cola, 79-78; 2 hembras de la misma localidad: ala, 89-92; cola, 69-73. El espécimen del Vaupés, ala, 88; cola, 73 mm., de tal manera que coincide mejor con las hembras, luégo por su tamaño pudiera ser un ejemplar de este último sexo. En cuanto a coloración no se encuentra la menor diferencia con los especímenes tanto machos como hembras del Caquetá.
Registrada en La Macarena norte, Morelia y Tres Esquinas.

FORMICARIIDAE

Tamnophilus schistaceus capitalis Sclater

Mitú: 1 ♀. Octubre 7, 1960.

Por tener esta hembra las regiones inferiores teñidas de ocráceo brillante y las axilares de antecino ocráceo se acerca a *heterogynus* (Hellmayr), del noroeste del Brasil. Por lo demás concuerda con la descripción de la hembra dada por Sclater (1890: 224) quien anotó este Formicárido como *Dysithamnus schistaceus;* lo único en lo cual se difiere la hembra del Vaupés es en llevar la cara de un oliváceo ferrugíneo teñido levemente de grisáceo.

Ala, 64; cola, 51.5; culmen expuesto, 17; tarso, 19.6 mm.

Las localidades más cercanas al Vaupés de donde hay registros son Los Micos y río Guapaya (Macarena sur) de donde Blake (1962: 93) anota 4 machos y 2 hembras.

Registrada, además, en el río Dudita (La Macarena norte), Florencia, Morelia, Umbría, Cuembí y Loretoyacu.

Thamnophilus amazonicus cinereiceps Pelzeln

San José del Guaviare: 1.

Registrada en el río Vaupés enfrente a Tauapunto, Maipures y Matabén.



Cercomacra tyrannina tyrannina (Sclater)

Mitú: 2. Mitú: 1 ♂. Agosto 20, 1960, coleccionado por A. Olivares.

Las dos hembras no aclaran nada en la determinación subespecífica, pues según Todd (1927: 161) las hembras de las dos subespecies que habitan en Colombia son indistinguibles.

Olivares (1962: 331) anota en *vicina* 3 machos y una hembra de La Macarena sur; los machos están en un todo de acuerdo con la descripción original de Todd (*loc. cit. supra*) por ser más claros en sus regiones inferiores que ejemplares de *tyrannina* (Sclater); llevar los flancos teñidos de oliváceo morenusco claro y tener externamente las alas y cola de un oliváceo morenusco. Estos son los especímenes coleccionados de *vicina* más hacia el sureste de Colombia; ahora, que *vicina* se extienda hasta el extremo oriente del país (Vaupés) lo niega el presente macho, que carece de las características anotadas para los machos de La Macarena sur y coincide en dichos detalles con ejemplares del mismo sexo de *tyrannina,* aunque sí hay que advertir que lleva un muy leve tinte oliváceo en los flancos, pero no en alas y cola.

La especie *tyrannina* presenta un punto de interés ornitogeográfico en la región cisandina colombiana. Se necesitan buenas series de diversas localidades para conocer mejor las áreas correspondientes a las subespecies y las localidades de intergradación.

Tyrannina ha sido regitrada en Villavicencio, río Dudita, Los Micos, río Guapaya y Macacuní. *Vicina* en Palmar, río Cubugón y El Porvenir en Boyacá; río Cobaría, La Ceiba, río Bojabá en Arauca.

Myrmeciza atrothorax metae > atrothorax

San José del Guaviare: 1.

Hembra por coloración. Es intergradante entre *metae* y *atrothorax* pues la garganta no es completamente blanca sino que lleva el blanco hacia la región inferior de aquélla, teñido de rufo. En dimensión del ala (57 mm.) está más de acuerdo con *atrothorax,* según De Schauensee (1947: 5); además, la región dorsal es bastante teñida de oliváceo.

La subespecie *metae* se ha registrado tan sólo en los Llanos del Meta, cerca a la base de los Andes Orientales. *A. atrothorax* (Boddaert) Phelps y Phelps, jr. la citan de Venezuela, San Carlos (río Negro) límite con Colombia en el Vaupés.

Hylophylax poecilinota duidae Chapman

Mitú: 2.

De la descripción original Chapman (1923: 7): "Female... the crown and nape amber-brown; the forehead and side of the head briter rufus", se trata de apartar uno de estos ejemplares, que es hembra, por llevar la frente entre "amber-brown" y rufo casi del mismo color de la conilla y nuca; los lados de la cara sí son de un rufo brillante.

Registrada en el río Guainía, Macacuní y La Macarena norte y sur (*cf. Olivares,* 1962: 332).

COTINGIDAE

Iodopleura isabellae isabellae Parzudaki

San José del Guaviare: 2.

De la descripción de la especie dada por Sharpe (1888: 393): "lower belly white", difieren estos ejemplares por tener la parte baja del abdomen y los lados de éste blancos barreteados de negro, pero sobre esta característica puede verse a Todd (1950: 6) quien al describir una nueva raza (*paraensis*) aclara el punto y dice que un par de especímenes del río Vaupés, Colombia coleccionados enfrente a Tauapunto, Brasil, puede presumirse que correctamente representen a *isabellae.*

Uno de los especímenes debe ser una hembra por no llevar plumas alargadas y de color azul violáceo a cada lado del pecho, las cuales en el macho van a cubrir la parte alta del abdomen y flancos.

En el rótulo de uno de los ejemplares se lee: "Iris café".

Registrada también en San Felipe y Macacuní (Guainía), Barrigón y Villavicencio.

Tityra cayana subsp.

Mitú: 1.

Es una hembra y por esto no fue posible determinar con precisión a qué subespecie pertenece; también puede ser un intergradante entre *cayana* (Linneo) y *candida* de De Schauensee; cuyas áreas de distribución están ambas en el extremo oriente colombiano; la primera al norte y la segunda al sur.

La subespecie *cayana* ha sido registrada en Maipures; *candida* en Palmar, río Cobaría, La Ceiba (Arauca); Fátima (Boyacá); Villavicencio, Caño Suría, Apiay, San Martín, La Macarena sur y norte, Florencia, Morelia, Tres Esquinas, Cuduyarí, río Vaupés y Leticia.

PIPRIDAE

Teleonema filicauda filicauda (Spix)

San José del Guaviare: 2.

Las rectrices más exteriores en uno de los ejemplares, que debe ser una hembra por coloración, y joven, son muy cortas (45 mm.) en comparación con una hembra del Meta (67 mm.). El otro ejemplar que también puede ser una hembra por coloración tiene la cola muy gastada.

Registrada en Maipures, Quenane, Florencia y Loretoyacu.

Xenopipo atronites Cabanis

Mitú: 1.

El plumaje está un poco desgastado, por esto el oliváceo del vexilo externo de las rémiges es casi imperceptible.

Registrada en Colombia solamente en el río Vaupés enfrente de Tauapunto.

Manacus manacus interior Chapman

Caño Cuduyarí: 2.

Con la descripción original, (Chapman, 1914: 624) sólo están de acuerdo estos ejemplares, al ser comparados con una serie de *abditivus* Bangs del Departamento de Bolívar, Colombia, en aquello de "...the chin feathers (beard) shorter, broader and less stiffened" lo que evidentemente se observa en los especímenes del Vaupés.

Registrada en Palmar, Villavicencio, Los Micos, Belén y Maipures.

TYRANNIDAE

Ochthornis littoralis (Pelzeln)

Mitú: 1.

El autor (Olivares, 1962: 334) encontró esta especie en abundancia en las orillas del río Guayabero (La Macarena sur); coleccionó 7 ejemplares. Es el registro más cercano al Vaupés.

Registrada también en La Macarena norte, Chafuray, Morelia y Tres Esquinas.

Muscivora tyrannus monachus (Hartlaub)

San José del Guaviare: 1.

Registrada en Villavicencio, río Ariari, Quenane, Peralonso, Rondón, San Martín y La Macarena sur.

Myiozetetes granadensis obscurior Todd

San José del Guaviare: 1.

Registrada en Villavicencio, La Macarena norte y sur, Morelia y Umbría.

Pitangus sulphuratus trinitatis Hellmayr

San José del Guaviare: 1.

Sobre nidos, polluelos y otros datos ecológicos, véase a Olivares (1962: 335). Hellmayr (1927: 150) indirectamente menciona ejemplares de Villavicencio.

Hay además registros de Caño Suría, Apiay y Yurimena.

Tolmomias flaviventris collingwoodi (Chubb)

San José del Guaviare: 1.

Concuerda con especímenes de La Macarena sur. San José del Guaviare limita con el Meta, y Blake (1962: 101) adscribió un macho de Los Micos (Macarena norte) a *collingwoodi* y dice: "Meta specimens show no evidence of intergradation with either *viridiceps* (Caquetá) or *aurulentus* (Santa Marta, etc.) and can be considered typical of *collingwoodi*".

Registrada además, en Quenane y Maipures.

Ramphotrigon ruficanda (Spix)

San José del Guaviare: 2.

Había sido ya registrada en Vaupés, enfrente de Tauapunto, además en Quenane.

Colopterix galeatus Boddaert

Mitú: 1. Agosto 21, 1960. Coleccionado por A. Olivares.

Está en plumaje desgastado. Ultimamente llegaron a la colección ICN, 5 especímenes del Vaupés, coleccionados de mayo 5 al 21 y están en plumaje fresco. La identificación de este género es muy sencilla por la característica tan notoria de tener las tres rémiges primarias exteriores muy cortas.

Había sido registrada en Colombia solamente en Maipures.

Elaenia flavogaster flavogaster (Thunber)

San José del Guaviare: 2.

Registrada en Peralonso, Puerto López y Umbría.

Elaenia parvirostris Pelzeln

Mitú: 1 ♂. Agosto 20, 1960. Coleccionado por A. Olivares.

Se le envió el espécimen a De Schauensee, quien lo estudió y comunicó (*in lit.*): "Agrees with a large series".

Este residente de verano ya había sido registrado en el río Guainía, (entre un 8 y 18 de mayo), además, en Florencia (junio 24-julio 4).

Sublegatus modestus brevirostris (D'Orbigny and Lafresnaye)

M(uscipeta) brevirostris D'Orbigny and Lafresnaye, 1837, Mag. Zool., VII, Cl. 2, "Syn. Av.," p. 49. Corrientes, rep. Argentina.

Mitú: 1 ♀, octubre 4, 1960.

Para sinonimia y datos interesantes sobre este migratorio, véase a Zimmer (1941: 2).

El presente ejemplar fue identificado por De Schauensee, quien dice: "agrees with a series of 12 Bolivian specimens".

Siendo una ave nueva para Colombia y migratorio del sur, permítase intercalar una descripción como suplemento a "Aves migratorias en Colombia" (Olivares 1959).

Regiones superiores, cinéreo claro, las plumas de la cabeza son alargadas, tratando de formar copete y tienen una mancha astilar negruzca; alas y cola negruzcas, las coberteras alares con borde apical y subapical blanquecino, lo mismo que el de las rémiges secundarias, el borde interno de las rémiges también es blanquecino; las rectrices con un angosto borde apical blanquecino y el borde externo de la más exterior teñido de blanco amarillento; coberteras infra-alares medianas amarillentas; axilares grises; garganta, cuello y pecho, cinéreo blanquecino, abdomen y coberteras infracaudales, amarillo limón pálido; flancos gris oliváceo; tibias negruzcas con un tinte amarillento. Iris cafesoso, pico y patas, cuerno negro.

Ala, 70.3; cola, 60; culmen expuesto, 8.5, anchura enfrente de las narinas, 4.5; tarso, 18 mm.

La localidad más cercana a Colombia en donde se le ha coleccionado es en el Perú. Puede ser un residente de verano en Colombia.

Tyranniscus gracilipes gracilipes Sclater y Salvin

Caño Cuduyarí: 1.

Había un registro de Macacuní.

Tyrannulus elatus (Latham)

Mitú: 1.

Sobre la posibilidad de dos subespecies en Colombia véase a De Schauensee (1950: 857); si las hubiera, a la región del Vaupés correspondería la nominada.

La localidad más cercana a Mitú de donde hay registros es Maipures; hay también registros de Villavicencio, Morelia, Belén y Umbría.

HIRUNDINIDAE

Progne calybea calybea (Gmelin)

Mitú: 2.

Existía un registro de Mitú, además hay registros de Florencia, Morelia, Belén y Tres Esquinas.

Hirundo rustica erythrogaster Boddaert

Mitú: 1 ♂. Octubre 27. Plumaje fresco.

Este residente de invierno había sido ya registrado en Mitú (octubre 1º); además, en Los Micos, río Guapaya, Pico Rengifo (en La Macarena norte, febrero 25 a abril 13); río Guayabero (en La Macarena sur, febrero 20); Loretoyacu (marzo 23), Caucayá (noviembre 15).

CORVIDAE

Cyanocorax violaceus violaceus Du Bus

San José del Guaviare: 3.

Para datos ecológicos de esta especie consúltese a Olivares (1962: 336) quien encontró esta ave en abundancia en La Macarena sur.

Registrada, además, en Los Micos, Villavicencio, Barrigón, Quenane, Peralonso, Yurimena, Menegua, río Dudita, Florencia y Tres Esquinas.

TROGLODYTIDAE

Microcerculus marginatus marginatus (Sclater)

Mitú: 1.

La localidad típica de esta subespecie está tomada de una piel rotulada "Bogotá". Estudiando colecciones, la localidad más cercana a Bogotá de donde hay registros es Villavicencio, de tal manera que el espécimen ("trade skin") sobre el cual hizo la descripción original, probablemente fue capturado en los alrededores de Villavicencio.

Registrada, además, en el río Guapaya (La Macarena), Morelia y Florencia.

Cyphorhinus aradus salvini Sharpe

Mitú: 1.

Se anota a *salvini* entre otras razones porque Todd (1932: 13) dice que esta subespecie se diferencia de *transfluvialis* por llevar ésta las coberteras auriculares mayormente rufas en lugar de ser completamente oliváceas como la espalda; el material del Vaupés tiene caracterizado el oliváceo del parche de las auriculares, aunque un poco más claro que el oliváceo de la espalda.

Leucolepis Reichenbach, 1850 debe substituírse por *Cyphorhinus* Cabanis, 1844.

Registrada en Umbría y Cuembí.

MIMIDAE

Donacobius atricapillus atricapillus (Linneo)

San José del Guaviare: 1.

Es más claro en sus regiones superiores que ejemplares del Meta y tan oscuro como especímenes del Caquetá y Amazonas, por lo cual con estos últimos entraría en *nigrodorsalis* Traylor del Perú, pero Blake (1962: 38) quien anota capturas en Boyacá y Arauca, dice: "As the two types of plumage are about equally represented in the large series from eastern Colombia, British Guayana, Brazil, and southeastern Perú (Madre de Dios) now before me it is evident that *nigridorsalis* and *atricapillus* are inseparable".

Las dimensiones en esta especie en sus diferentes subespecies son un poco variables, y así el ala de 6 especímenes de *brachipterus* Madarász, de la región noroeste de Colombia va de 74.5 a 83.6 mm. (78.5); 9 de la región sur cisandina colombiana que por coloración pertenecerían a *nigrodorsalis,* 79.3 a 92 (87.7); 6 de la región media cisandina *atricapillus,* incluyendo el ejemplar de San José del Guaviare, 73.5 a 83 (78.0).

La subespecie *atricapillus* ha sido registrada en varias localidades de Arauca y Boyacá; además de Villavicencio, Acacías, Pachaquiaro, Morelia, Tres Esquinas, Loretoyacu, Isla de Ronda y Leticia.

TURDIDAE

Turdus ignobilis debilis Hellmayr

San José del Guaviare: 1.

Concuerda muy bien con material del Meta, Caquetá y Putumayo, en coloración; en dimensiones, el ala es un poco más pequeña (105 mm.).

Registrada en Villavicencio, Peralonso, río Dudita, Morelia, Tres Esquinas y Rumiyaco.

SYLVIDAE

Microbates collaris collaris (Pelzeln)

Mitú: 1.

No teniendo material de la subespecie *collaris* para comparación y diciendo la descripción original de *perlatus* Todd (1927: 161) quien la describió de Tonantins (Río Solimoes, Brasil), que difiere de la nominada por tener *perlatus* la banda pectoral más ancha y las partes posteriores inferiores más oscuras, no se puede identificar el espécimen del Vaupés con precisión; la banda pectoral es más o menos de 6 mm. de anchura; las regiones inferiores posteriores son de un *"Snuff Brown"*.

Registrada en Florencia, Morelia y Cuembí.

VIREONIDAE

Vireo flavifrons Vieillot

Mitú: 1. Diciembre, 1961.

Es un poco más claro que un espécimen coleccionado en N. J.: Ft. Lee, mayo 10, 1912 por Jay A. Weber, pero sí las dimensiones son iguales: ala, 74; cola, 49 mm. De dos ejemplares, uno del Chocó (marzo 7, 1959) y otro de Bolívar, Colombia (enero 30, 1961) se diferencia el del Vaupés por ser éste un poco más claro y más pequeño. Ala en el del Chocó, 75.8; cola, 52; en el de Bolívar, ala, 78; cola, 52.

No había sido registrada en la región cisandina colombiana.

COEREBIDAE

Dacnis flaviventer Lafresnaye y d'Orbigny

Mitú: 1 ♂. Agosto 16, 1960. Coleccionado por A. Olivares.

Identificado por De Schauensee quien comunicó (*in lit.*): "Agrees with other colombian specimens".

Registrada en Morelia, Belén, Umbría y río Sucumbíos.

ICTERIDAE

Psaracolius decumanus decumanus (Pallas)

San José del Guaviare: 1.

Sobre nidación y otros datos ecológicos véase a Olivares (1962: 338) quien coleccionó en La Macarena sur 5 especímenes, y varios nidos. Esta región es la localidad más cercana a San José del Guaviare.

Registrada también en Buenavista, Restrepo, Apiay, Quenane, Yurimena, Villavicencio, Barrigón, río Dudita, Maipures, Florencia, Belén, Tres Esquinas y Umbría.

Scaphidura oryzivora oryzivora (Gmelin)

San José del Guaviare: 2.

La Macarena sur y norte es la localidad más cercana al Vaupés donde se había coleccionado esta ictérida. Blake (1962: 108) registra un macho de Los Micos (La Macarena norte).

Sobre el empleo de *Scaphidura* en lugar de *Psomocolax* consúltese a Parkes (1954: 229), quien después de una discusión muy bien documentada, concluye: "The Rice Grackle thus becomes *Scaphidura orizyvora* (Gmelin)".

Registrada además, en Villavicencio, Barrigón, Florencia, Morelia, Tres Esquinas y Loretoyacu.

THRAUPIDAE

Tanagra xanthogaster brevirostris (Bonaparte)

Mitú: 2. Caño Cuduyarí: 1.

Por coloración son dos machos y una hembra. Los machos son más oscuros que uno de Tres Esquinas; aquéllos llevan el pecho y la región superior del abdomen teñidos de anaranjado ocráceo pálido.

Registrada en San Felipe (Guainía) y también en los Llanos de Casanare, río Dudita, La Macarena norte, Andalucía, Florencia, Morelia, Tres Esquinas y Cuembí.

Tangara chilensis coelicolor (Sclater)

Mitú: 3.

En estos tres ejemplares la parte baja de la espalda es escarlata y la rabadilla y coberteras supracaudales,

amarillo, lo que coincide con la descripción dada por Sclater (1886: 96-97) quien la llamó *Calliste tatao*.

Ala en los tres ejemplares, 74-72.8-71; cola, 51-53-48 mm.

Es el Tanágrido que ostenta más diversidad de colores, de ahí que algunos autores le dieron el nombre específico de *paradiceus* y otro, queriendo ser más preciso, el de *septicolor*.

Registrada en el río Guainía y Macacuní, además, en Villavicencio, río Ocoa, Apiay, río Guapaya (La Macarena norte).

Tachyphonus surimanus brevipes Lafresnaye

Caño Cuduyarí: 1.

Este ejemplar es un macho por coloración. De la descripción de Sclater (1886: 212), difiere por no presentar "with a slight fulvous tinge on the front portion of the axillaries"; probablemente Sclater examinó un ejemplar joven. Un espécimen de La Macarena sur carece también de dicho detalle. Tal vez varias de las últimas plumas de la rabadilla llevan sobre el color fulvo una mancha negra subapical muy característica; en los ejemplares examinados tan sólo cada uno lleva una pluma con la mancha negra, quizás, debido a que en la preparación se cayeron las demás.

Había ya varios registros del Vaupés (río Vaupés) enfrente de Tauapunto (Brasil), Macacuní, río Guainía enfrente del Brazo de Casiquiare (Venezuela); además, de Villavicencio, La Macarena, Morelia, Belén, Rumiyaco y Umbría.

Cissopis leveriana leveriana (Gmelin)

Caño Cuyudarí: 1.

Registrada en Villavicencio, Apiay, ríos Ocoa y Ariari, La Macarena norte y sur, Florencia, Morelia, Tres Esquinas y Leticia.

FRINGILLIDAE

Pitylus grossus grossus (Linneo)

Mitú: 1.

La característica anotada para los machos de *grossus* o sea que tienen la espalda de un azul pizarra más claro que *saturatus* es muy difícil observarla en el presente ejemplar al compararlo con una serie de esta subespecie de la costa del Pacífico (Guapí, Cauca) y un espécimen del río Tanela (Chocó). Comparada una hembra de la región trasandina colombiana con otra de la cisandina se nota que la primera tiene las partes inferiores sin el tinte oliváceo que llevan las de la segunda, invirtiéndose así la característica dada por los autores para *saturatus*. Una hembra de Leticia tiene dichas partes de un moreno antecino.

Registrada en los ríos Ocoa y Guapaya; Caño Yerlí, Morelia y Leticia.

Paroaria gularis gularis > nigro-genis

San José del Guaviare: 1.

Este ejemplar presenta aquella característica dada para *nigro-genis* (Lafresnaye) y que anota Hellmayr (1938: 62): "the sides of the head (loral streak, orbicular and auricular regions) black", en lo cual difiere de especímenes de La Macarena sur, del Caquetá y del Amazonas (*gularis*) con los cuales se comparó pero no lleva como *nigro-genis* las plumas gularis de diferente textura, más compactas, más angostas y decididamente lanceoladas, sino que en este particular es igual a los especímenes de las localidades citadas. No tiene el "small sooty chin spot" de *nigro-genis* bien caracterizado, apenas es vestigial, y no presenta como esta última subespecie, la garganta "bright crimson" sino que este color es oscuro y un poco teñido de negruzco. Por lo dicho, puede ser una intergradación entre *gularis* y *nigro-genis*. Se anota en la primera por razones geográficas, no estando San José del Guaviare distante de La Macarena norte más de unos 150 kilómetros, donde se coleccionaron tres ejemplares de *gularis*.

Gularis ha sido registrada en Morelia, Tres Esquinas, Leticia, Loretoyacu y *nigro-genis*, de los Llanos de Arauca y Meta y de Maipures.

Arremon taciturnus taciturnus (Hermann)

Mitú: 2.

Uno de estos dos ejemplares que es un macho por coloración tiene muy bien definido el collar negro pectoral y la mandíbula inferior es negra; el otro que es una hembra se distingue del macho por carecer del collar negro, tan sólo tiene un vestigio de éste, representado en una banda grisácea; además, el blanco de la garganta y cuello anterior está teñido de antecino y la banda longitudinal de la coronilla es de ante grisáceo; la mandíbula inferior es negra; este último detalle separa la hembra de *taciturnus* de la de *axillaris* Sclater. De tal manera que se trata de la especie nominada, que sólo se había registrado en la región cisandina colombiana, en el río Orinoco, en Colombia (Maipures).

Friedmann (1948: 586) anota especímenes del Brazo del Casiquiare en Venezuela y de San Gabriel, en el noroeste del Brasil, localidades que rodean al Vaupés, Colombia. Al occidente del Vaupés la localidad más cercana donde se ha coleccionado la especie en su subespecie *axillaris* es La Macarena sur y norte.

Arremon conirostris conirostris Bonaparte

San José del Guaviare: 1.

Concuerda en un todo este ejemplar con varios de La Macarena sur, los cuales, Olivares (1962: 341) anotó sin determinación subespecífica, debido a la carencia de material de comparación, y trae una breve discusión taxonómica; pero últimamente Blake (1962: 111), quien debió consultar grandes series, adscribió 3 machos de Los Micos y dos hembras del río Guapaya (La Macarena norte) que dista unos 160 kilómetros en línea recta de San José del Guaviare, a *A. c. conirostris;* debido a esto tentativamente se anota el espécimen del Vaupés como *conirostris*.

Registrada además en Casanare, Villavicencio y San Martín.

Myiospiza humeralis humeralis (Bosc)

San José del Guaviare: 1.

Registrada en Villavicencio, La Macarena norte y sur, Quenane, Yurimena, Peralonso, Puerto López y Maipures.

SUMMARY

To the previous studies on the Vaupés ornis (Olivares, 1955 and Olivares and Hernández, 1962) 84 species and subspecies are added, of which only 11 had been recorded from the región by one or two captures. In order to have a better understanding of the avifauna of the eastern Colombia, all the localities in the cisandineam región of the country in which have also been collected the species and subspecies treated in this paper from Vaupés are given. The present collection was made from May to December, 1961; the exact localities are Mitú and San José del Guaviare.

Seleneidera nattereri and *Sublegatus modestus brevirostris,* a migrant from the south of South America, are registered for first time in Colombia; the existence of *Galbula dea brunneiceps* is confirmed. *Anas discors* and *Vireo flavifrons* had not been recorded before in the cisandineam region of Colombia.

BIBLIOGRAFIA CITADA

BLAKE, Emmet R.

1961 "Notes on a Collection of Birds From Northeastern Colombia". Fieldiana: Zoology, *44* (4): 25-44, November 27, 1961.

1962 "Birds of the Sierra Macarena, Eastern Colombia". Fieldiana: Zoology, *44* (11): 69-112, May 28, 1962.

BORRERO, José Ignacio

1955 "Apuntes sobre aves colombianas (Nº 2)". Lozania (Acta Zoológica Colombiana), *9,* pp. 1-15, Agosto 20, 1955.

1960 "Notas sobre aves de la Amazonia y Orinoquia Colombiana". Caldasia, *8* (39): 485-514, Diciembre 20, 1960.

CORY, Charles B. y Charles E. HELLMAYR

1927 "Catalogue of Birds of the Americas and the adjacent Islands in the Field Museum of Natural History, Part V, Tyrannidae". Field Museum of Natural History, Publ. 242, Zoological Series, *13,* pp. I-VI-1-517, April 11, 1927.

CHAPMAN, Frank Mickler

1914 "Diagnoses of Apparently New Colombian Birds III. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. *33,* Art. XL, pp. 603-637, November 21, 1941.

1917 "The Distribution of Bird-life in Colombia. A Contribution to a Biological Survey of South America". Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., *36,* pp. I-X, 1-726, figs. 1-21, pls. I-XLI, November, 1917.

1923 "Descriptions of Proposed New Formicariidae and Dendrocolaptidae". Amer. Mus. Nov., Nº 86, pp. 1-20, August 28, 1923.

DE SCHAUENSEE, Rodolpho Meyer

1947 "On the Genera *Automolus* (Furnariidae) and *Myrmeciza* (Formicariidae) in Colombia" Notulae Naturae, Nº 186, pp. 1-5, Febrero 14, 1947.

1948 "The Birds of the Republic of Colombia..." (Primera entrega: Tinamidae-Cathartidae)". Caldasia, *5* (22): 251-280, Noviembre 20, 1948.

1949 *"Id.* (Segunda entrega: *Accipitridae-Picidae*)". Caldasia, *5* (23), pp. 381-644, Septiembre 28, 1949.

1950 *"Id.* (Tercera entrega: Dendrocolaptidae-Tyrannidae)". Caldasia, *5* (24), pp. 645-871, Julio 10, 1950.

1951 *"Id.* (Cuarta entrega: Alandidae-Fringillidae)". Caldasia, *5* (25), pp. 873-1112, Agosto 31, 1951.

1952 *"Id.* (*Addenda* and *Corrigenda*)". Caldasia, *5* (26), pp. 873-1222, Julio 1º, 1952.

DUGAND, Armando

1952 "Algunas aves del río Apaporis". Lozania (Acta Zoológica Colombiana), *4,* pp. 1-12, Julio 19, 1952.

FRIEDMANN, H.

1948 "Birds Collected by the National Geographic Society's Expenditions to Northern Brazil and Southern Venezuela". Proc. U. S. Natl. Mus. *97* (3219): 373-509, pls. 16-27.

HELLMAYR, Charles E.

1938 "Catalogue of Birds of the Americas and the adjacent Islands in the Field Museum of Natural History, Part. XI, Ploceidae —Catamblyrhynchidae— Fringillidae". Field Museum of Natural History, Publicación 430, Zoological Series, *13,* pp. I-VI, 1-662. December 31, 1938.

OLIVARES, Antonio, O.F.M.

1955 "Algunas aves de la Comisaría del Vaupés (Colombia)". Caldasia, *7* (33): 259-275. Diciembre 30, 1955.

1959 "Aves migratorias en Colombia". Rev. Acad. Colomb. Cienc., *10* (41): 371-442, mapas, láminas.

1962 "Aves de la región sur de la Sierra de La Macarena, Meta, Colombia". Rev. Acad. Colomb. Cienc., *5* (44): 306-358, 1 mapa, figs. 16, Diciembre, 1962.

OLIVARES, Antonio, O.F.M. y Jorge HERNANDEZ

1962 "Aves de la Comisaría del Vaupés (Colombia)". Rev. Biol. Trop. Universidad de Costa Rica, *10* (1): 61-90, 1 mapa, Universidad de Costa Rica, Julio 1962.

PARKES, Kenneth C.

1954 "The Generic Name of the Rice Grackle". The Condor *56* (4): 173-260, July-August, 1954.

PHELPS, W. H. y W. H. PHELPS, Jr.

1950 "Lista de aves de Venezuela con su distribución, parte 2 Passeriformes". Soc. Venez. Cienc. Nat., *2* (75): 1-248, 1 mapa, Marzo, 1950.

1958 *"Id.* Tomo II, parte 1, No Passeriformes" *Id. 19* (90): 1-318.

PINTO, O. M. de O.

1938 "Catalogo das Aves do Brasil 1º Parte", Rev. Mus. Paulista, *22,* pp. 1-566.

1944 *"Id., 2º* Parte" Dep. Zool. Secr. Agr., Ind. Com., Sao Paulo, pp. I-XI, 1-700, fgs., Agosto de 1944.

SCLATER, Philip Lutley

1886 "Catalogue of the Passeriformes or Perching Birds in the Collection of the British Museum. Fringillimormes: Part. II. Containing the Families Coerebidae, Tanagridae, and Icteridae". Cat. Bds. Brit. Mus. *11,* pp. I-XVII, 1-427, pls. I-XVIII, London, Taylor and Francis.

1890 "Catalogue of the Passeriformes or Perching Birds, in the Collection of the British Museum. *Tracheophonae,* or the Families *Dendrocolaptidae, Formicariidae Conopophagidae* and *Pteroptochidae".* Cat. Bds. Brit. Mus., *15,* pp. I-XVIII, 1-372, Pls. I-XX, London: Taylor and Francis.

SHARPE, Richard Bowdler.

1888 "Catalogue of the Passeriformes, or Perching Birds in the Collection of the British Museum.

Oligomyodae... Eurylaemidae". Cat. Bds. Brds. British Mus., *14,* pp. I-XIX, 1-494, pls., I-XXVI, London: Taylor and Francis.

TODD, W. E. Clyde

1927 "New Gnateaters and Antbirds From Tropical America, with a Revision of the Genus *Myrmeciza* and Its Allies". Biol. Soc. Washington, *40,* pp. 149-178, December 2, 1927.

1932 "New South American Wrens". Proc. Biol. Soc. Wash., *45*: 9-14, April 2, 1932.

1943 "Art. I. Studies in the Jacamars and Puff-Birds.". Ann. Carn. Mus., *30,* pp. 1-8, October 20, 1943.

1950 "Critical Notes on the Cotingas". Proc. Biol. Soc. Wash., *63,* pp. 5-8, April 26, 1950.

ZIMMER, John T.

1934 "Studies on Peruvian Birds. XVI. Notes on the Genera *Glyphorhynchus*... and *Sclerurus*". Amer. Mus. Nov., Nº 757, pp. 1-22, November 30, 1934.

1940 *"Id.* Nº XXXIV. The Genera *Todirostrum*... and *Hemitriccus*". *Id.* Nº 1066, pp. 1-23, May 3, 1940.

1941 *"Id.* Nº XXXVII The Genera *Sublegatus*... and *Tyranniscus*". Id. Nº 1109, pp. 1-25, May 15, 1941.

1950 *"Id.* Nº 59. The Genera *Polytmus*... and *Amazilia*". Id. 1475, 1-28, November 24, 1950.