

Tabla 3S. Tipos de espiguillas trifloras en las tribus Paniceae y Paspaleae y distribución de la sexualidad de las flores. (1): tomado de **Morrone & Zuloaga** (1989); (2): tomado de **Cialdella & Vega** (1996); (3): tomado de **Morrone & Zuloaga** (1991); (4): el presente trabajo; (5): tomado de **Giraldo-Cañas** (2004).

Tipo de espiguilla triflora	Sexualidad de la flor inferior	Sexualidad de la flor media	Sexualidad de la flor superior	Especies
I	Estaminada	Estaminada	Perfecta	<i>Paspalum glabrinode</i> (1)
II	Estaminada	Perfecta	Perfecta	<i>Anthaenantiopsis perforata</i> var. <i>perforata</i> (2) <i>Anthaenantiopsis fiebrigii</i> (2)
III	Neutra	Estaminada	Perfecta	<i>Lasiacis anomala</i> (2) <i>Panicum crateriferum</i> (2) <i>Panicum grumosum</i> (2)
IV	Neutra	Neutra	Perfecta	<i>Lasiacis anomala</i> (2) <i>Panicum quadriglume</i> (2)
V	Neutra	Perfecta	Perfecta	<i>Panicum sabulorum</i> (3) <i>Axonopus anceps</i> (4) <i>Axonopus scoparius</i> (4) <i>Axonopus schultesii</i> (4) <i>Digitaria nuda</i> (5)
VI	Neutra	Estaminada	Estaminada	<i>Digitaria dioica</i> (5)