

**Tabla 4S.** Características de las subdivisiones infragenéricas de *Axonopus* P. Beauv. (Poaceae: Panicoideae: Paspaleae). Cabe destacar que aquí no se siguieron las subdivisiones a nivel de subserie propuestas por **Black** (1963), toda vez que estas son muy ambiguas y, además, dichas subseries no son monofiléticas (**Giraldo-Cañas**, 2007). \*\*: Recientemente, **López & Morrone** (2012) transfirieron tres especies de dos géneros endémicos brasileños (*Centrochloa* Swallen y *Ophiochloa* Filg., Davidse & Zuloaga) al género *Axonopus*. No obstante, dichos autores no ubicaron las tres especies en ninguna de las secciones establecidas para el género: *Axonopus bryoides* (G. H. Rua, R. C. Oliveira & Valls) A. López & O. Morrone, *Axonopus hydrolithicus* (Filg., Davidse & Zuloaga) A. López & O. Morrone y *Axonopus singularis* (Swallen) A. López & O. Morrone; dichas especies y sus características no están incluidas en esta tabla.

| Características   | Sección <i>Axonopus</i>  | Sección <i>Axonopus</i>   | Sección <i>Axonopus</i>    | Sección <i>Axonopus</i>  | Sección <i>Axonopus</i>   | Sección <i>Axonopodes</i> | Sección <i>Lappagopsis</i>          | Sección <i>Senescentia</i>       |
|---|--|---|----------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|   | Serie <i>Axonopus</i>  | Serie <i>Barbigeri</i>  | Serie <i>Capillares</i>    | Serie <i>Fastigiati</i>  | Serie <i>Suffulti</i>   |                           |                                     |                                  |
| Hábito  | Perenne  | Perenne   | Annual                     | Perenne  | Perenne   | Perenne o anual           | Perenne                             | Perenne                          |
| Filotaxis   | Caulinar   | Caulinar, equitante, basal  | Caulinar                   | Caulinar   | Caulinar, equitante   | Caulinar                  | Caulinar, basal                     | Caulinar, basal                  |
| Panoja  | Simple   | Simple, raras veces compuesta (algunos racimos con ramificación de segundo orden) | Simple                     | Simple   | Simple, raras veces compuesta (algunos racimos con ramificación de segundo orden) | Simple                    | Simple                              | Simple                           |
| Raquis con tricomas de base tuberculada (y color de los tricomas) | Ausentes   | Ausentes  | Ausentes                   | Ausentes   | Ausentes  | Presentes (dorados)       | Presentes (blanco-hialinos)         | Presentes (blanquecino-hialinos) |
| Espiguilla  | Subsésil   | Subsésil a pedicelada   | Subsésil                   | Subsésil   | Subsésil  | Subsésil                  | Subsésil                            | Subsésil                         |
| Espiguilla con tricomas de base tuberculada                       | Ausentes   | Ausentes  | Ausentes                   | Presentes  | Ausentes  | Ausentes                  | Presentes                           | Ausentes                         |
| Nervios de la gluma superior y la lema inferior                   | Notorios   | Notorios a muy fuertes  | Notorios                   | Notorios (los laterales escabriúsculos a fuertemente escabrosos) | Notorios débiles  | Débiles                   | Notorios                            | Notorios                         |
| Color del antecio superior  | Pajizo   | Pajizo  | Pajizo a castaño muy claro | Pajizo o castaño   | Castaño a castaño oscuro  | Castaño a castaño oscuro  | Castaño a castaño oscuro o negruzco | Pajizo                           |
| Ornamento del antecio superior                                    | Ornamentado  | Ornamentado a muy ornamentado   | Poco ornamentado           | Ornamentado  | Poco ornamentado  | Poco ornamentado          | Ornamentado a muy ornamentado       | Ornamentado                      |
| Número total de especies**  | Ca. 16   | 24  | 3                          | 2  | 15  | 2                         | 3                                   | 3                                |
| Número de especies en Colombia                                    | 5  | 7   | 1                          | 0  | 3   | 2                         | 0                                   | 1                                |
| Nivel de ploidía  | 2x,4x,6x, 8x,10x   | 2x, 6x, 8x  | 2x, 4x                     | Sin registros  | 2x, 4x  | 2x                        | Sin registros                       | Sin registros                    |
| Distribución geográfica   | EE.UU. a Argentina y Uruguay e Isla de Pascua (Chile) (algunas introducidas en el Viejo Mundo) | Sudamérica (al este de los Andes)   | México, Meso y Sudamérica  | Bolivia y Brasil   | Meso Sudamérica y   | Meso Sudamérica y         | Bolivia, Paraguay y sur de Brasil   | Norte de Sudamérica              |