

Anexo 1. Porcentajes de germinación y tiempo medio de germinación de *Vaccinium meridionale* en tres fuentes semilleras localizadas en los municipios de Ráquira, San Miguel de Sema (Boyacá) y Gachetá (Cundinamarca)

Beneficio	Fuentes semilleras	Tratamiento	Germinación (%)	TMG
Fermentado	Finca El Pozo	AC: 100 %	28,67	85
		AV: 50 %	24,67	105
		GA ₃ : 500 ppm	14,00	81
		KNO ₃ : 500 ppm	25,33	125
		Testigo	22,67	100
	Finca La Plazuela	AC: 100 %	25,33	123
		AV: 50 %	22,00	121
		GA ₃ : 500 ppm	28,00	129
		KNO ₃ : 500 ppm	23,33	160
		Testigo	28,67	128
	Finca Mata de Caña	AC: 100 %	20,00	112
		AV: 50 %	25,33	127
		GA ₃ : 500 ppm	28,67	115
		KNO ₃ : 500 ppm	20,00	120
		Testigo	25,33	134
Sin fermentar	Finca El Pozo	AC: 100 %	22,00	125
		AV: 50 %	20,00	143
		GA ₃ : 500 ppm	16,00	107
		KNO ₃ : 500ppm	24,00	115
		Testigo	30,00	137
	Finca La Plazuela	AC: 100 %	18,00	142
		AV: 50 %	20,67	144
		GA ₃ : 500 ppm	24,00	117
		KNO ₃ : 500 ppm	31,33	129
		Testigo	26,67	110
	Finca Mata de Caña	AC: 100 %	24,00	135
		AV: 50 %	19,33	117
		GA ₃ : 500 ppm	18,00	83
		KNO ₃ : 500 ppm	21,33	94
		Testigo	24,67	129

TMG: Tiempo medio de germinación, AC: agua de coco, AV: *Aloe vera*, GA₃: Ácido giberelico, KNO₃: Nitrato de potasio