

**Tabla 3S.** Composición y estructura de la fauna íctica registrada en las estaciones evaluadas en el bosque muy húmedo pre-montano (bmh-PM), del municipio de Ibagué.

Taxón	QAG (Mc)	QAM (Mc)	QCHE (Bpt)	QCJ (Pas)	QCY (Pas)	QCY (Pas)	QCY (Pas)	QGL (Pas)	QGL (Pas)	QGO (Bpt)	QLC (Bpt)	QMB (Arb)	QPG (Mc)	QSR (Bpt)	RLC (Mc)	RLC (Mc)	Total	A.R. (%)
<b>Characiformes</b>																		
<b>Characidae</b>																		
<i>Bryconamericus tolimae</i>	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,0
<b>Siluriformes</b>																		
<b>Astroblepidae</b>																		
<i>Astroblepus cf. gentheri</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4
<i>Astroblepus chapmani</i>	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	9	1,2
<i>Astroblepus sp.3</i>	0	0	0	0	20	46	15	19	1	2	0	0	0	5	0	0	108	14,0
<i>Astroblepus grixalvii</i>	0	13	23	0	7	35	1	17	23	1	26	0	7	0	0	0	153	21,1
<i>Astroblepus homodon</i>	0	0	0	0	1	0	2	7	0	0	0	0	0	3	0	0	13	1,7
<i>Astroblepus micrescens</i>	8	0	0	11	0	0	2	0	0	21	0	7	0	0	0	24	73	10,0
<i>Astroblepus sp.1</i>	0	0	0	9	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2,0
<i>Astroblepus sp.2</i>	0	2	0	0	7	16	2	0	0	1	0	0	0	3	3	0	34	4,6
<i>Astroblepus sp.4</i>	34	14	1	0	39	97	16	25	2	0	0	0	0	7	24	33	292	40,2
<i>Astroblepus sp.5</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,14
<b>Trichomycteridae</b>																		
<i>Trichomycterus retropinis</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0,41
<i>Trichomycterus sp.1</i>	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,69
<i>Trichomycterus transandianus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,14
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>199</b>	<b>38</b>	<b>97</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>725</b>	<b>100</b>